

Darwini, *Baccharis Darwini*, *Senecio Darwini*, *Calceolaria Darwini*, *Carex Darwini*, etc.

Entre los fósiles que atesoran nuestras formaciones muchos le fueron dedicados, por ejemplo: *Fusus Darwinianus*, *Furritella Darwini*, *Nucula Darwini*, *Venus Darwini*, *Arca Darwini*, etc.

Los navegantes que atraviesan el canal Beagle, contemplan también el *Monte Darwin*, de 2,135 metros de altura, no léjos de la costa austral de la Tierra del Fuego, al oriente del monte Sarmiento».

Cárlos E. PORTER.



BREVE NOTA DE MICOLOJIA

El Prof. don Carlos E. Pórter tuvo la amabilidad de remírtirme en Setiembre del año pasado algunos hongos coleccionados por él en Chile, rogándome le comunicara su clasificación oportunamente.

Causas ajenas a mi voluntad me impidieron acceder ántes a los deseos del ilustrado naturalista chileno.

1.º *Hebeloma simiosum* (Fr.)—Sacc. Syll. Fung. sól. 5 pág. 792

Hab.—In pratis prope San Felipe, 22 Sept. 1908.

Obs.—Specimina Chilensia cum Europaeis ammino confluentia statura habituque; sporae elliptico-subovatae leniter inaequilaterales (12-15 μ long.=6-5 μ lat.) laeves non v. 1-guttulatae pallide ferrugineae.

2.º *Cystopus candidus*.—Pers.

Hab.—Ad caules foliaque *Capsellae bursae pastoris* in pratis prope Panimavida, Sep. 1908.

Obs.—Specimina conidia et oogonia simul ostendunt; conidia eximie cum Europaeis et Argentinis congruent; oogonia autem a classicis descriptis valte recedunt et facile prospecem alienam sumenda, globosa (35-50 μ diam.) tunica consolori laevissima crassa obsoletissime concentrice striolata endoplasmate granuloso guttulato hyalino faretata solitaria in quaque matricis cellula matriceque diffuse obscureque violascenta.

3.º **Cocoma punctato-striatum.**—Diet. et Neg.=Sacc. Syll. Fung. vol. 14.º, p. 408.

Hab.—Ad ramulos *Baccharidis glutinosae* prope San Felipe, Sept. 1908.

4.º **Uromyces cestri.**—Montgn.=Sacc. Syll. Fung. v. VII.º p. 584.

Hab.—Ad folia viva *Cestri parqui* in saepibus Panimavida, Sep. 1908.

Obs.—Sori teleutosporici saepius macula orbiculari cinerascete determinata epiphylla insidentes saepius aecidiis numerosis hypophyllis (*Aecidium cestri* Montgn.) concomitati.

5.º **Puccinia malvacearum.**—Bary.=Sacc. Syll. Fung. v. VII.º pág. 686.

Hab.—Ad folia viva *Malvae parviflorae* prope San Felipe, Sept. 1908.

Cárlos Spegazzini

